

■ 消化器内科

MSI-High固形癌

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day28 |
|--------------------------|-------|-------------|------|------|-------|
| (4週毎)オブジーボ480mg(MSI-H大腸) | ニボルマブ | 480 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day42 |
|----------------------------|----------|-------------|------|------|-------|
| (6週毎)キイトルーダ400mg(MSI-H固形癌) | ペムブロリズマブ | 400 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|-----------------------|--------|-------------|------|------|-------|
| NIVO+IPI併用療法(MSI-H大腸) | ニボルマブ | 240 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | イピリムマブ | 1 mg/kg | 点滴静注 | ○ | |
| | | (最大4サイクル) | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|---------------------|----------|-------------|------|------|-------|
| キイトルーダ(MSI-High固形癌) | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|---------------------|-------|-------------|------|------|-------|
| オブジーボ240mg(MSI-H大腸) | ニボルマブ | 240 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

上部消化管クラスター(食道癌)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day28 |
|---------------------|-------|-------------|------|------|-------|
| (4週毎)オブジーボ480mg(食道) | ニボルマブ | 480 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day42 |
|----------------------|----------|-------------|------|------|-------|
| (6週毎)キイトルーダ400mg(食道) | ペムブロリズマブ | 400 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day21 |
|-------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| DCF | ドセタキセル | 70 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | | |
| | シスプラチン | 75 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | | |
| | フルオロウラシル | 750 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 休薬完了 | | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|---------|--------|----------------------|------|------|-------|
| DOC(食道) | ドセタキセル | 70 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day21 |
|---------------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| FP(術前・術後補助療法) | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | | |
| | フルオロウラシル | 800 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 休薬完了 | | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day4 | day28 |
|------------------------|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Standard FP(70,700)+RT | シスプラチン | 70 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | フルオロウラシル | 700 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|--------------|----------|------------------------|------------|---------|------|------|-------|
| mFOLFOX6(食道) | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | ←—————→ | | | |
| | | 休薬完了 | | | | ○ | |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day22 | day29 | day36 | day49 |
|----------------|---------|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| weekly PTX(食道) | パクリタキセル | 100 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|----------------|-------|-------------|------|------|-------|
| オブジーボ240mg(食道) | ニボルマブ | 240 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|------------|----------|-------------|------|------|-------|
| キイトルーダ(食道) | ペムブロリズマブ | 200 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

上部消化管クラスター(胃癌)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day28 |
|--------------------|-------|-------------|------|------|-------|
| (4週毎)オブジーボ480mg(胃) | ニボルマブ | 480 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day22 | day29 | day36 | day49 |
|-----------|----------|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5-FU+I-LV | レボホリナート | 250 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | フルオロウラシル | 600 mg/m ² | 点滴静注 | | | | | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|---------------------|--------|---------|------|------|-------|
| Biweekly R-mab療法(胃) | ラムシルマブ | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|-----------|--------|-----------------------|------|------|-------|
| CPT-11(胃) | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day21 | day35 |
|-------------|--------|-------------|------|------|------|-------|-------|
| S-1+CDDP(胃) | シスプラチン | 60/m | 点滴静注 | | ○ | | |
| | S-1 | 80-120/body | 経口投与 | ← | → | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|------------|-------------|-----------------------|------|------|-------|-------|
| SOX+HER(胃) | トラスツズマブ(初回) | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | (2回目以降) | 6 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | S-1 | 80-120 mg/body | 経口投与 | ← | → | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|--------|----------|-----------------------|------|------|-------|-------|
| SOX(胃) | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | S-1 | 80-120 mg/body | 経口投与 | ← | → | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|-------------|----------|------------------------|------------|------|------|------|-------|
| mFOLFOX6(胃) | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | ← | → | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|--------------|-------------|------------------------|------|------|-------|-------|
| XELOX+HER(胃) | トラスツズマブ(初回) | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | (2回目以降) | 6 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カペシタピン | 2000 mg/m ² | 経口投与 | ← | → | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|-----------------------|---------|----------------------|------|------|------|-------|-------|
| weekly PTX+R-mab療法(胃) | ラムシルマブ | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | ○ | |
| | パクリタキセル | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|----------|-----------------|-----------|------|------|-------|
| エンハーツ(胃) | トラスツズマブ デルクステカン | 6.4 mg/kg | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|---------------|-------|-------------|------|------|-------|
| オブジーボ240mg(胃) | ニボルマブ | 240 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|-------|--------|------------------------|------|------|-------|-------|
| XP | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カペシタピン | 2000 mg/m ² | 経口投与 | ← | → | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|------------|---------|------------------------|------|------|-------|-------|
| XP+HER(初回) | トラスツズマブ | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カペシタピン | 2000 mg/m ² | 経口投与 | ← | → | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|---------------|---------|------------------------|------|--------|-------|-------|
| XP+HER(2回目以降) | トラスツズマブ | 6 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カペシタビン | 2000 mg/m ² | 経口投与 | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

進行大腸癌

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day7 |
|--------------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| C-mab weekly 1クール目 | セツキシマブ | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day7 |
|----------------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| C-mab weekly 2クール目以降 | セツキシマブ | 250 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day14 |
|--------------------|--------|-----------------------|------|------|------|-------|
| C-mab+CPT-11 1クール目 | セツキシマブ | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | | 250 mg/m ² | 点滴静注 | | ○ | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day14 |
|----------------------|--------|-----------------------|------|------|------|-------|
| C-mab+CPT-11 2クール目以降 | セツキシマブ | 250 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day8 | day14 |
|---------------------|----------|------------------------|------------|--------|------|------|------|-------|
| C-mab+FOLFIRI 1クール目 | セツキシマブ | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | 250 mg/m ² | 点滴静注 | | | | ○ | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day8 | day14 |
|-----------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------|--------|------|------|-------|
| C-mab+FOLFIRI 2クール目以降 | セツキシマブ | 250 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | ○ | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day8 | day14 |
|----------------------|----------|------------------------|------------|--------|------|------|------|-------|
| C-mab+mFOLFOX6 1クール目 | セツキシマブ | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | 250 mg/m ² | 点滴静注 | | | | ○ | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day8 | day14 |
|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|------------|--------|------|------|-------|
| C-mab+mFOLFOX6 2クール目以降 | セツキシマブ | 250 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | ○ | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | | |
| | | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|------------|----------|------------------------|------------|--------|------|------|-------|
| FOLFIRI+BV | ペバシズマブ | 5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|---------|----------|------------------------|------------|--------|------|------|-------|
| FOLFIRI | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューザーポンプ | ←————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|-----------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| FOLFOXIRI+B-mab | ペバシズマブ | 5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 165 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 3200 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day15 | day28 |
|--------------|--------|-----------------------|------|------|--------|-------|-------|
| IRIS+BV (大腸) | ペバシズマブ | 5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | ○ | |
| | イリノテカン | 100 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | ○ | |
| | S-1 | 80-120 mg/body | 経口投与 | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|----------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| P-mab+mFOLFOX6 | パニツムマブ | 6 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|----------------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| FOLFIRI+Afibercept療法 | アフリベルセプト | 4 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|---------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| FOLFIRI+R-mab | ラムシルマブ | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|--------|----------|-----------------------|------|------|--------|-------|
| SOX+BV | ペバシズマブ | 7.5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | S-1 | 80-120 mg/body | 経口投与 | | ←————→ | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|----------|----------|------------------------|------|------|--------|-------|
| XELOX+BV | ペバシズマブ | 7.5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | |
| | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カベシタピン | 1600 mg/m ² | 経口投与 | | ←————→ | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 | day21 |
|-------|----------|------------------------|------|------|--------|-------|
| XELOX | オキサリプラチン | 130 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | |
| | カベシタピン | 2000 mg/m ² | 経口投与 | | ←————→ | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|-------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| mFOLFOX6+BV | ペバシズマブ | 5 mg/kg | 点滴静注 | ○ | | | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|-------------------------|----------|------------------------|------------|------|--------|------|-------|
| mFOLFOX6+C-mab biweekly | セツキシマブ | 500 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | | ←————→ | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

神経内分泌癌(小細胞癌)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day28 |
|-----------|--------|----------------------|--------|------|------|------|-------|
| AMR(SCLC) | アムルピシン | 40 mg/m ² | 静注(緩徐) | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|--------------|---------|----------------------|------|------|------|-------|-------|
| CBDCA+CPT-11 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 60 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day21 |
|-------------|---------|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| CBDCA+VP-16 | カルボプラチン | AUC5 | 点滴静注 | ○ | | | |
| | エトポシド | 100 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|-------------|--------|----------------------|------|------|------|-------|-------|
| CDDP+CPT-11 | シスプラチン | 60 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 60 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day21 |
|------------|--------|-----------------------|------|------|------|------|-------|
| CDDP+VP-16 | シスプラチン | 80 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | エトポシド | 100 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

平滑筋肉腫

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day21 |
|---------|-------|-----------------------|------|------|------|-------|
| Halaven | エリブリン | 1.4 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|-------------|---------|-----------------------|------|------|-------|
| Trabectedin | トラベクテジン | 1.2 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|------------------------------------|----------|----------------------|------|------|-------|
| ドキシソルピシン単独療法(75mg/m ²) | ドキシソルピシン | 75 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

悪性中皮腫

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day28 |
|----------------------|-------|-------------|------|------|-------|
| (4週毎)オブジーボ480mg(中皮腫) | ニボルマブ | 480 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|---------------|--------|-----------------------|------|------|-------|
| CDDP+PEM(中皮腫) | ペムレキセド | 500 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | シスプラチン | 75 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|-----------------|-------|-------------|------|------|-------|
| オブジーボ240mg(中皮腫) | ニボルマブ | 240 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

肝胆膵クラスター(胆)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|-----------|--------|------------------------|------|------|------|-------|-------|
| GEM(膵・胆道) | ゲムシタピン | 1000 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day21 |
|--------------|--------|------------------------|------|------|------|-------|
| GEM+CDDP(胆道) | シスプラチン | 25 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | |
| | ゲムシタピン | 1000 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | ○ |

肝胆膵クラスター(肝臓)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day21 |
|--------------------|---------|-------------|------|------|-------|
| Atezolizumab+BV(肝) | アテゾリズマブ | 840 mg/body | 点滴静注 | ○ | |
| | ベバシズマブ | 15 mg/kg | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|----------------|--------|---------|------|------|-------|
| Biweekly R-mab | ラムシルマブ | 8 mg/kg | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

肝胆膵クラスター(膵臓)

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day14 |
|-----------|--------|-----------------------|------|------|-------|
| CPT-11(膵) | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|------------|----------|------------------------|------------|---------|------|------|-------|
| FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 180 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 400 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | ←—————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|--------|--------|------------------------|------|------|------|-------|-------|
| GEM(膝) | ゲムシタピン | 1000 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|---------------------|----------|------------------------|------------|---------|------|------|-------|
| Modified FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | ←—————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day2 | day3 | day14 |
|-----------------|----------|------------------------|------------|---------|------|------|-------|
| NaI-IRI+5-FU+LV | イリノテカン | 70 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | レボホリナート | 200 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | | | |
| | フルオロウラシル | 2400 mg/m ² | インヒューサーポンプ | ←—————→ | | | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |

| レジメン名 | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | day1 | day8 | day15 | day28 |
|-------------|-----------------|------------------------|------|------|------|-------|-------|
| nab-PTX+GEM | アルブミン懸濁型パクリタキセル | 125 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | ゲムシタピン | 1000 mg/m ² | 点滴静注 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 休薬完了 | | | | ○ |